



Glaubersalz

Pulver zum Trinken nach Auflösen in Wasser

Wirkstoff: 100 g Pulver enthalten: 100 g Natriumsulfat-Decahydrat

Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach 3 Tagen nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht:

1. Was ist Glaubersalz und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Glaubersalz beachten?
3. Wie ist Glaubersalz einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Glaubersalz aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Glaubersalz und wofür wird es angewendet?

Glaubersalz ist ein salinisches Abführmittel.

Anwendungsgebiete:

- zur kurzfristigen Anwendung bei Verstopfung (Obstipation)
- zur Darmentleerung vor diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Glaubersalz beachten?

Glaubersalz darf nicht eingenommen werden:

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Natriumsulfat-Decahydrat sind,
- bei Darmverschluss.

Es sollte nicht angewendet werden bei:

- Bluthochdruck,
- Herzinsuffizienz,
- entzündlichen Magen-Darm-Erkrankungen sowie
- Störungen des Wasser- und Elektrolythaushalts.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Glaubersalz einnehmen, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Kinder:

Glaubersalz darf bei Kindern unter 6 Jahren nicht angewendet werden.

Einnahme von Glaubersalz zusammen mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. vor Kurzem eingenommen/angewendet haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen/anzuwenden.

Die Empfindlichkeit gegenüber herzwirksamen Glykosiden kann aufgrund erhöhter Kaliumverluste verstärkt werden. Der Kaliumverlust kann bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln verstärkt werden.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Glaubersalz sollte während der Schwangerschaft nicht verwendet werden, da es die bestehende Neigung zur Bildung von Wasseransammlungen (Ödemen) verstärken kann. Schädliche Wirkungen von Natriumsulfat-Decahydrat während des Stillens sind nicht bekannt.

Fragen Sie vor der Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen:

Es liegen keine Erfahrungen hinsichtlich der Beeinträchtigung der Verkehrstüchtigkeit und der Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen vor.

3. Wie ist Glaubersalz einzunehmen?

Dosierung und Art der Anwendung

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach der mit Ihrem Arzt oder Apotheker getroffenen Absprache ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Dosis beträgt: Soweit nicht anders verordnet, trinken Erwachsene 2 bis 4 Teelöffel voll (10 bis 20 g) Glaubersalz in ca. 250 ml Wasser gelöst. Für eine rasche Darmentleerung werden 1 bis 2 Esslöffel voll (20 bis 30 g) in ca. 500 ml Wasser gelöst getrunken. Kinder über 6 Jahre erhalten die halbe Dosis.



Dauer der Anwendung:

Glaubersalz soll nur kurzfristig angewendet werden. Eine längerfristige Anwendung führt zu einer Verstärkung der Darmträgheit.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Glaubersalz zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge Glaubersalz eingenommen haben, als Sie sollten

und sich aufgrund der höheren Dosis Beschwerden einstellen, benachrichtigen Sie bitte Ihren Arzt. Dieser kann gegebenenfalls über erforderliche Maßnahmen entscheiden. Möglicherweise treten die unter Nebenwirkungen aufgeführten Beschwerden verstärkt auf.

Bei Überdosierung von Glaubersalz kann es zum Entzug von Wasser mit Elektrolytstörungen kommen. Die Therapie hat sich an den Symptomen zu orientieren.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei der Anwendung sehr hoher Dosen oder chronischer Anwendung von Glaubersalz kann es zu erhöhtem Natriumgehalt des Blutes, Wasseransammlungen (Ödemen) und Bluthochdruck kommen.

Wie bei anderen Abführmitteln kann es bei längerdauernder Anwendung zu erhöhten Verlusten von Wasser, Kalium und anderen Salzen kommen. Dies kann zu Störungen der Herzfunktion und zu Muskelschwäche führen, insbesondere bei gleichzeitiger Einnahme von harntreibenden Mitteln und Nebennierenrindensteroiden.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
Abt. Pharmakovigilanz
Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn
Website: www.bfarm.de
anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Glaubersalz aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton bzw. Etikett nach „Verwendbar bis“ angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Nicht über 25 °C und im Originalbehältnis fest verschlossen lagern.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Glaubersalz enthält:

Der Wirkstoff ist: Natriumsulfat-Decahydrat

100 g Pulver enthalten: 100 g Natriumsulfat-Decahydrat

Sonstige Bestandteile sind nicht enthalten.

Wie Glaubersalz aussieht und Inhalt der Verpackung:

Glaubersalz ist ein weißes kristallines Pulver, welches in Dosen mit 100 g Inhalt in einer Faltschachtel erhältlich ist.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller:

DISTRICON GmbH

Am Joseph 15

D-61273 Wehrheim

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Juni 2018.

Für Experten-Video
QR-Code scannen:



REV01/2018.06