



Für
Experten-
Video
QR-Code
scannen

Medizinische Desinfektion

2-Propanol 70% (V/V); Lösung zur Anwendung auf der Haut

Art der Anwendung:

Desinfektionsmittel zum Auftragen auf die Haut und zur Bereitung von Umschlägen

Warnhinweise:

Leicht entzündlich! Von Zündquellen fernhalten! Dicht verschlossen aufbewahren. Bei Verschütten der Lösung sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen der verschütteten Flüssigkeit und das Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Tipp für Diabetiker:

Vor Blutzuckermessungen und Insulininjektionen die Einstichstelle mit der SOS Medizinischen Desinfektion sorgfältig abreiben und 15 Sekunden lang feucht halten. Vor der Injektion die desinfizierte Stelle vollständig abtrocknen lassen.

150 ml Lösung

Pharmazeutischer

Unternehmer und Hersteller:

DISTRICON GmbH

Am Joseph 15, 61273 Wehrheim



Ch.-B.:

Verwendbar bis:

Zul.-Nr.:
1599.98.99

PZN-13706612



Gebrauchsinformation: bitte sorgfältig lesen!

Anwendungsgebiete:

Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion, zur Hautdesinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße, zur Hautdesinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken, zur Desinfektion talgdrüsenreicher Haut; zur Bereitung von Kühlumschlägen.

Gegenanzeigen:

Nicht zur Desinfektion offener Wunden und Schleimhäute geeignet; nicht in unmittelbarer Nähe von Augen anwenden.

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln: keine bekannt.

Dosierungsanleitung und Art der Anwendung:

- Zur hygienischen Händedesinfektion werden die Hände mit der Lösung eingerieben und 30 Sekunden lang feucht gehalten.
- Zur chirurgischen Händedesinfektion werden Hände und Unterarme mit der Lösung eingerieben und 5 Minuten lang feucht gehalten.
- Zur Desinfektion vor einfachen Injektionen und Punktionen peripherer Gefäße wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 15 Sekunden lang feucht gehalten.
- Zur Desinfektion vor Operationen und vor Punktionen von Gelenken wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 1 Minute lang feucht gehalten.
- Zur Desinfektion von talgdrüsenreicher Haut wird die Haut mit der Lösung sorgfältig abgerieben und 10 Minuten lang feucht gehalten.
- Für Kühlumschläge ist die Lösung mit gleichen Teilen Wasser verdünnt anzuwenden.

Hinweise:

Die Zeitangaben sind Mindestzeiten. Je nach zusätzlichen Erschwernissen (z. B. feuchte Haut, Verschmutzung der Haut, Risiko des Eingriffs) sind die Einwirkzeiten zu verlängern. Medizinische Desinfektion wirkt nicht sporenabtötend und ist daher für die Aufbewahrung steriler Instrumente und Spritzen nicht geeignet.

Nebenwirkungen:

Beim Einreiben in die Haut können Rötungen und leichtes Brennen auftreten.

Meldung von Nebenwirkungen:

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die hier nicht angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abteilung Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen.

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

Zusammensetzung:

100 g Lösung enthalten:

Wirksamer Bestandteil: 2-Propanol 63,1 g;

Sonstiger Bestandteil: Gereinigtes Wasser

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.

Stand der Information: Januar 2017

210_REV02/2017.07

**begrenzt viruzid gem. RKI/
DVV (HBV, HIV, BVDV, HCV,
Vakzina- und Grippeviren),
Rotaviren inaktivierend*

