

Gebrauchsinformation: Bitte sorgfältig lesen.

Bitte lesen Sie die folgende Gebrauchsinformation aufmerksam durch. Sie enthält wichtige Informationen darüber, was Sie bei der Einnahme dieses Medizinproduktes beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Medizinprodukt Kräuter Hustensirup mit Manuka Honig

Zusammensetzung:

Glucosiersirup, Wasser, Honig (7,5%), Holundersaft-Konzentrat, Manuka-Honig (2,5%), Salbeittinktur, Isländisch Moos Extrakt (1,53%), Citronensäure, Kaliumsorbit, Natriumbenzoat, Fenchelöl

Darreichungsform und Inhalt:

Flasche mit Sirup zu 150 ml Inhalt zum Einnehmen.

Anwendungsgebiete:

Zur Unterstützung der natürlichen Schutzfunktion der Schleimhäute

- Reizhusten, Heiserkeit und Halsschmerzen werden bei trockenem Husten ohne Schleimbildung spürbar gelindert
- Ein pflanzlicher Sirup, der sich als Schutzfilm auf die gereizten Schleimhäute im Mund-, und Hals- und Rachenbereich legt

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Für Kinder ab 2 Jahren und Erwachsene:

- Kinder von 2 bis 6 Jahren 3–4 mal täglich 2,5 ml
- Kinder und Jugendliche von 6 bis 12 Jahren 3–4 mal täglich 5 ml
- Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 3–4 mal täglich 10 ml

Zur optimalen Benutzung des Mund- und Rachenschleimhaut wird Kräuter Hustensirup ca. 30 Sekunden im Mund verteilt und anschließend geschluckt. Vor Gebrauch gut schütteln. Zur Dosierung den beigelegten skalierten und zertifizierten Messbechern verwenden. Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 7 Tagen keine Besserung eintritt, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Die Anwendung sollte die Dauer von 14 Tagen nicht überschreiten.

Gegenanzeigen:

Kräuter Hustensirup darf nicht angewendet werden:

- bei Kindern unter 2 Jahren
- wenn Sie allergisch/überempfindlich gegen einen der unter „Zusammensetzung“ genannten Bestandteile dieses Medizinproduktes sind.
- nach Operationen, bei Verletzungen oder starken Entzündungen im Hals- oder Rachenbereich.
- wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Dieses Medizinprodukt enthält Sucrose (Saccharose-/Zucker), Fructose, Glucose und Sorbitol. Bitte nehmen Sie Kräuter Hustensirup bei einer Unverträglichkeit erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein.

Da keine Untersuchungen vorliegen, sollte Kräuter Hustensirup nicht während der Schwangerschaft und Stillzeit eingenommen werden.

Vorsichtsmaßnahmen und besondere Hinweise:

Enthält 1,75 Vol.-% Alkohol. Kräuter Hustensirup sollte nicht gleichzeitig mit anderen in der Mundhöhle anzuwendenden Medizinprodukten oder Arzneimitteln (Kaugummis, Lutschtabletten, Gurgellösungen) oder Produkten des täglichen Bedarfs (Lebensmitteln, Getränken, Zahnpflegemitteln) eingenommen werden. Ein Abstand von einer ½–1 Stunde wird empfohlen. Der häufige und dauernde Gebrauch von Kräuter Hustensirup kann schädlich für die Zahne sein (Karies). Die Anwendung bei Kindern unter 12 Jahren sollte nur unter Aufsicht Erwachsener stattfinden.

Nebenwirkungen:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch sind keine Nebenwirkungen zu erwarten.

Aufbewahrungshinweise:

Nach Anbruch nicht länger als 4 Wochen verwenden. Kräuter Hustensirup darf nur bis zu dem auf dem Etikett und der Faltschachtel mit „Verwendbar bis“ bezeichneten Datum verwendet werden. Nicht über 25 °C und nicht unter 5 °C aufbewahren.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

■■■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven, Germany
Vertrieb durch: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe
Stand der Information: Februar 2019

■■■ Használati utasítás: Kérjük, figyelmesen olvassa el! Olvassa el figyelmesen az alábbi használati utasítást, mert az Ön számára fontos információkat tartalmaz, amelyeket az orvostechnikai eszköz alkalmazásakor be kell tartsa. Ha kérdése van, forduljon kezelőorvosához vagy gyógyszerészéhez.

Orvostechnikai eszköz Gyógynövényes köhögés elleni szírup manuka mézzel

Összetétel: Glükózsírup, viz (7,5%), bodzalé koncentrátum, manuka méz (2,5%), zsály tintkura, islónyi mohavonat (1,53%), citromsav, kalóm-szorbát, nátrium-benzoát, édesköréményolaj.

Adagolási forma és tartalom: 150 ml-es palack szír száján történő alkalmazásra.

Rendeltetés: A Mivolis gyógynövényes köhögés elleni szír olyan növényi szír, amely véddőfilmet alkot a száj, a torok és a garat irritált nyálkahártyáján.

Alkalmazási területek:

- A nyálkahártya természetes véddőfunkciójának támogatására
 - Nyálkahártyával nem külön száraz köhögés esetén az irritatív köhögés, a rekedtség és a torokfájás észrevételei enyhítésére.
- Adagolási időtartam, az alkalmazás módja és időtartama: 2 éven felüli gyermekek és felnőttek:
- 2-6 év közötti gyermekek napi 3-4 alkalommal 2,5 ml
 - 6-12 év közötti gyermekek napi 3-4 alkalommal 5 ml
 - Felnőttek és 12 éven feletti fiatalok napi 3-4 alkalommal 10 ml

A száj és a torok nyálkahártyájának optimális nedvesítésére érdekelben a gyógynövényes köhögés elleni szír kb. 30 másodpercig forgassa a szájban, majd nyelje le. Használhat előtől rázza fel. Az adagoláshoz használja a mellékelt mérőlezeset és hitesítést, mérőpoharat. Ha tüneti súlyosodnak vagy 7 nap után sem javulnak, forduljon orvoshoz. Ne alkalmazza 14 napnál hosszabb ideig.

Ellenjavallatok: A gyógynövényes köhögés elleni szírpot nem szabad alkalmazni az alábbi esetekben:

- 2 éven aluli gyermekeknek
- allergia vagy túlerőszereggel az orvostechnikai eszköz „Összetétele“ által felsorolt bármely összetevőjével szemben
- műtétek után, sérelések vagy súlyos gyulladások esetén a torok vagy a garat területén
- bizonyos cukrokkal szembeni ismeri intolerancia. Ez a termék szukrótos (szacharóz/hádcukor), fruktóz, glükóz és sorbitot tartalmaz. Kérjük, intolerancia esetén a gyógynövényes köhögés elleni szírpot csak orvosival való konzultációt követően szedje.

Övintézkedések és különleges figyelmezettségek: 1,75 térfogat% alkoholt tartalmaz. A gyógynövényes köhögés elleni szír nem szedhető egyszerűleg más, a szájüregben alkalmazandó gyógyszerrel készítményekkel vagy gyógyszerekkel (rágogumik, pastíliák, gargarázlószerek) vagy minden nap használata szánt termékekkel (ételek, italok, fogkrémek). Egy ½ – 1 órás időköz tartása ajánlott. A gyógynövényes köhögés elleni szír gyakori és tartós használata káros lehet a fogakra (fogszúvásodás).

Terhesség és szoptatás: Mivel nem állnak rendelkezésre vizsgálati eredmények, így a gyógynövényes köhögés elleni szír nem szedhető terhesség és szoptatás alatt.

Mellékhatások: Rendeltetés szerű használat esetén mellékhatásokkal nem kell számítani.

Az orvostechnikai eszköz eltarthatóságával kapcsolatos információk és adatok: Felbontás után 4 héten belül fel kell használni. A gyógynövényes köhögés elleni szír csak a téglében és a kartondobozon található „„Felhasználható““ dátumon használható.



Gyermekekkel elzáva tartandó!

■■■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven

Forgalmazza: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe

A szöveg ellenőrzésének dátuma: 2019. Únor

■■■ Návod k použití: Čtěte pozorně! Tento návod k použití si důkladně prostudujte. Obsahuje důležité informace o tom, na co si můžete při užívání tohoto zdravotnického prostředku dát v pozor. S dotazy se obracejte na svého lékaře nebo lékárnu.

Zdravotnický prostředek Byliny sirup proti kaši s manukovým medem

Složení: Glukózový sirup, voda, med (7,5%), koncentrát bezové šťávy, manukový med (2,5%), Šalvějová tinktura, extrakt z islandského mechu (1,53%), citronová šťáva, sorban drásecký, benzoan sodný, řemenkový olej

Léková forma a obsah: Lahvička se sirupem o objemu 150 ml k perorálnímu užívání.

Určeno použití: Byliny sirup proti kaši s manukovým medem

Pokyny pro dávkování, typ a dobu užívání: Pro děti od 2 let a dospělé:

- Děti od 2 do 6 let 3 – 4krát denně 2,5 ml

- Děti a mladiství od 6 do 12 let 3 – 4krát denně 5 ml

- Dospělí a mladiství od 12 let 3 – 4krát denně 10 ml

Pro optimální zvláštění sлизnice úst a kruku se byliny sirup proti kaši válí v ústech po dobu cca 30 sekund a poté se spolkne. Před použitím důkladně protřepete. K dávkování použijte přiloženou certifikovanou odměrkou se stupnicí. Když se vaše otěžní zhorší nebo po 7 dnech nenastane žádné zlepšení, vyhledejte lékaře. Doba užívání ne měňte překročit 14 dní.

Kontraindikace: Byliny sirup proti kaši se nesmi používat:

- u dětí mladších než 2 roky

- pokud ještě alergický/přetícitlivý na složky uvedené ve „složení“ tohoto zdravotnického prostředku

- po operacích, při zraněních nebo silných závratích v oblasti kruku a hltanu

- pokud je vám známo, že trpite nesmíšenlivostí vůči určitým cukrům. Tento zdravotnický prostředek obsahuje sacharóz (cukr), fruktóz, glukóz a sorbitol.

Užívání s látkami: Užívání v děti mladších než 12 let by se mělo uskutečnit pouze pod dozorem dospělého. Těhotenství a kojení: Protože nejsou k dispozici žádné studie, neměl by se byliny sirup proti kaši užívat v době těhotenství a kojení.

Nezádoucí účinky: Při použití podle pokynů se žádné nezádoucí účinky neočekávají.

Pokyny k dobu použitelnosti zdravotnického prostředku: Po otevření nepoužívejte déle než 4 tydny. Byliny sirup proti kaši smí být užíván pouze do doby vyzařeného na etiketě a na papírové krabičce „„Datum použitelný““.



Uchovávejte mimo dosah dětí.

■■■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven

Distributor: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe

Stav informaci: Luty 2019

■■■ Ulotka dla pacjenta: Dokładnie zapoznaj się treścią ulotki! Należy uważnie przeczytać poniższą ulotkę dla pacjenta, ponieważ zawiera ona ważne wskazówki, których należy przestrzegać podczas stosowania tego wyrobu leczniczego. W przypadku pytań należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Wybór medyczny Ziarnowy syrop na kaszel z miódem manuka

Skład: Syrop glukozowy, woda, miód (7,5%), koncentrat soku z czarnego bzu, miód manuka (2,5%), nalewka z szalwi, ekstrakt z mchu islandzkiego (1,53%), kwas cytrynowy, sorbinian potasu, benzoesan solny, olejek z kopru włoskiego

Postać dawkowania i zawartość: Buteleczka o pojemności 150 ml, zawierająca syrop goły do spożycia.

Przeznaczenie: Ziarnowy syrop na kaszel Mivolis jest wyrobem roślinnym, który pokrywa warstwą ochronną podziemne błony śluzowe jamy ustnej, gardla i krtani.

Obszary zastosowania:

- Jako wsparcie naturalnej funkcji ochronnej błon śluzowych

- Odczuwalne lagodzące katarodruchowe, chryptę i ból gardła w przypadku występowania suchego kaszlu bez tworzenia się wydzielin

Informacje na temat dawkowania, drogi podania oraz czasu stosowania:

Dzieci od 2. roku życia oraz dorosłi:

- Dzieci w wieku od 6 lat: 3-4 x dziennie 2,5 ml

- Dzieci i młodzież w wieku od 6 do 12 lat: 3-4 x dziennie 5 ml

- Dzieci i młodzież w wieku od 12 lat: 3-4 x dziennie 10 ml

W celu optymalnego nawilżenia błon śluzowych jamy ustnej i gardla, rozprowadź syrop ziołowy na kaszel w jamie ustnej przez około 30 sekund, a następnie prześlij. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Do dozowania używać dołączonej kartylkowanej miarki ze skala. Jeśli objawy się nasilą lub nie ustąpią po 7 dniach, należy skonsultować się z lekarzem. Nie stosować przez okres dłuższy niż 14 dni.

Przeciwwskazania: Zabronione jest stosowanie ziołowego syropu na kaszel:

- u dzieci poniżej 2. roku życia

- w przypadku uzupełnia/nadwrażliwości na którykolwiek z składników tego wyrobu medycznego wymienionych w sekcji „Skład“

- po zabiegach chirurgicznych, w przypadku urazów lub ciężkich stanów zapalnych gardła lub krtani

- w przypadku znanej nietolerancji określonych cukrów. Ten wyrob medyczny zawiera sacharozę (cukroz/cukier), fruktóz, glukóz i sorbitol. W przypadku występujących nietolerancji ziołowy syrop na kaszel należy przyjmować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Środki ostrożności oraz szczególny wskazania: Zawiera 1,75 % obj. alkoholu. Ziołowego syropu na kaszel nie należy przyjmować jednocześnie z innymi wyrobami medycznymi lub produktami leczniczymi stosowanymi w obrębie jamy ustnej (gumy do zębów, tabletki do ssania, płyny do plukania gardła) lub produktami codziennego użytku (żywność, napoje, pasty do zębów). Zaleca się zachowanie odstępu czasowego w zakresie od 0,5 do 1 godziny. Często i długotrwałe stosowanie ziołowego syropu na kaszel może działać szkodliwie na zęby (próchnica). Dzieci poniżej 12. roku życia powinny stosować wyrob wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Ciąża i karmienie piersią: Nie ma żadnych badań w tym zakresie, dlatego nie należy przyjmować ziołowego syropu na kaszel w okresie ciąży i w czasie laktacji.

Działania niepożądane: Przy stosowaniu zgodnie z zaleceniami nie należy spodziewać się wystąpienia działań niepożądanych.

Wskazówki oraz informacje na temat okresu trwałości wyrobu medycznego: Po otwarciu zużyć maksymalnie w ciągu 4 tygodni. Ziołowy syrop na kaszel należy stosować wyłącznie do daty wskazanej na etykiecie oraz skrzynki opakowania po słowach „może być stosowany do”.



Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven
Dystrybutor: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe

Ostatnia aktualizacja ulotki: Februar 2019.

(5) Informácie o použíti: Pozorne si prečítajte. Pozorne si prečítajte nasledujúce informácie o použíti. Obsahujú dôležité údaje o tom, čomu by ste mali venuovať pozornosť pri užívaní tejto zdravotníckej pomôcky. Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárniku.

Zdravotnická pomôcka Bylinkyový sirup proti kašľu s manukovým medom

Zloženie: glukózový sirup, voda, med (7,5%), koncentrát bazovej šťavy, manukový med (2,5%), šálaková tinktúra, extrakt z islandského machu (1,53 %), kyselina citrónová, sorbat draselný, benzoát sodný, feniklový olej

Spôsob podávania a obsah: Fláša so 150 ml sirupu na perorálne použitie.

Účel používania: Mivolis bylinkyový sirup proti kašľu je rastlinný sirup, ktorý pôsobí ako ochranný film na podráždené sliznice v oblasti úst, hrdla a hitanu.

Oblasti použitia:

- Na podporu prirodzenej ochrannej funkcie sliznic
- Suchý kašeľ, chrapot a bolest hrdla sa liečia suchým kašľom bez tvorby hlienu cieľne zmierňením

Pokyny na dávkovanie, spôsob a trvanie používania: Pre deti od 2 rokov a dospelých:

- Deti od 2 do 6 rokov 3 – 4-krát denne 2,5ml
- Deti a dospevajúci od 6 do 12 rokov 3 – 4-krát denne 5 ml
- Dospelí a dospevajúci od 12 rokov 3 – 4-krát denne 10 ml

A na optimálne zvýšenie siliznice čistá a hrdla nechajte bylinkyový sirup proti kašľu pôsobiť v ústach asi 30 sekúnd pred použitím. Pred použitím dobré prehrepte. Na dávkovanie používajte priložený certifikovaný odmerka so stupnicou? AK sa vaše príznaky zhoršia alebo sa nelepšia po 7 dňoch, malí by ste sa poradiť s lekárom. Používanie by nemalo presiahnuť 14 dní.

Kontraindikácie: Bylinkyový sirup proti kašľu sa nesmie používať:

- v prípade detí do 2 rokov
- ak ste alergickí/precitíveľní na niektorú zo zložiek tejto zdravotníckej pomôcky uvedených v časti „Zloženie“.
- po operáciách, pri poraneníach alebo ľahkých zápaloch v oblasti hrdla alebo hitanu.
- ak je váš známe, že trpite na neznášanlivosti niektorých cukrov. Táto zdravotnícka pomôcka obsahuje sacharózu, fruktózu, glukózu a sorbitol. Bylinkyový sirup proti kašľu užívajte v prípade neznášanlivosti len po konzultácii s lekárom.

Bezpečnostné opatrenia a osobitné pokyny: Obsahuje 1,75 % obj. % alkoholu. Bylinkyový sirup proti kašľu sa nemá užívať súčasne s inými zdravotníckymi pomôckami alebo liekmi určenými na použitie v ľustnej dutine (žuvačky, pastilky, kockadlá) alebo s výrobkami na každodenne použitie (potraviny, nápoje, zubné pasty). Odporúča sa odstup ½ hodiny – 1 hodina. Časťa a nepretržité užívanie bylinkyového sirupu proti kašľu môže byť škodlivé pre zuba (zubný kaz).

Tehotenstvo a dojenie: Keďže nie sú k dispozícii žiadne štúdie, bylinkyový sirup proti kašľu sa nesmie užívať počas tehotenstva a obdobie dojenia.

Nežiaduce účinky: Pri používaní podľa pokynov sa neočakávajú žiadne vedľajšie účinky.

Poznámky a informácie o dobe používania a dobe používania zdravotníckej pomôcky: Po otvorení nepoužívajte dlhšie ako 4 týždne. Bylinkyový sirup proti kašľu sa môže používať len do dátumu vyznačeného na etikete a skladacej škatulke podľa „Použiteľné do“.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven
Distribútor: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe
Stan informácií: Marec 2019

(1) Istruzioni per l'uso: Leggere attentamente! Leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso. Contengono informazioni importanti sulle considerazioni da effettuare quando prende questo dispositivo medico. In caso di domande, si rivolga al medico o al farmacista.

Dispositivo medico Sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche con miele di manuka

Composizione: Sciroppo di glucosio, acqua, miele (7,5%), concentrato di succo di sambuco, miele di manuka (2,5%), tintura di salvia, estratto di muschio islandese (1,53%), acido citrico, sorbato di potassio, benzoato di sodio, olio di finocchio

Forma farmaceutica e contenuto: Flacone da 150 ml di sciroppo per uso orale.

Destinazione d'uso: Lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche Mivolis è uno sciroppo di origine vegetale che forma un film protettivo sulle mucose irritate della bocca, della gola e della faringe.

Aree di applicazione:

- Per mantenere la naturale funzione protettiva delle mucose
- Tisse irritabile, raucedine e mal di gola sono sensibilmente alleviati se la tosse è secca e non c'è formazione di muco

Istruzione di dosaggio, metodo e durata d'uso: Per bambini da 2 anni e adulti:

- Bambini da 2 a 6 anni 2,5 ml 3 – 4 volte al giorno
- Bambini e adolescenti da 6 a 12 anni 3 – 4 volte al giorno 5 ml
- Adulti e adolescenti da 12 anni 10 ml 3 – 4 volte al giorno

Per mettere in modo ottimale la mucosa della bocca e della gola, distribuire lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche nella bocca per circa 30 secondi e poi deglutire. Agitare bene prima dell'uso. Utilizzare per il dosaggio il misurino graduato e certificato in dotazione. Se i sintomi peggiorano o non migliorano dopo 7 giorni, si rivolga al medico. L'utilizzo non deve superare un periodo di 14 giorni.

Contraindicationi: Lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche non deve essere utilizzato:

- nei bambini di età inferiore a 2 anni
- in caso di allergia/persensibilità a uno qualsiasi dei componenti di questo dispositivo medico menzionati in „Composizione“.
- dopo interventi chirurgici, infiammazioni nell'area del collo o della gola.
- se si è di avere un'intolleranza a determinati zuccheri. Questo dispositivo medico contiene saccarosio (saccarosio/zucchero), fruttosio, glucosio e sorbitolo. In caso di intolleranza, assuma lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche solo dopo aver consultato il medico.

Misure precauzionali e avvertenze particolari: Ha un tenore volumetrico di alcol pari a 1,75%. Non assumere lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche contemporaneamente ad altri dispositivi medici o medicamenti da utilizzare nel caffo orale (gomme da masticare, pastiglie, soluzioni per gargarismi) o prodotti di uso quotidiano (alimenti, bevande, dentifrici). Si consiglia un intervallo di ½ – 1 ora. L'uso frequente e continuo dello sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche può essere dannoso per i denti (caries).

Gravidanza e allattamento: Poiché non sono disponibili studi, lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche non deve essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Effetti collaterali: Se usato secondo le istruzioni, non si prevedono effetti collaterali.

Note e informazioni sulla durata utile del dispositivo medico: Una volta aperto, non utilizzare per più di 4

settimane. Lo sciroppo per la tosse a base di erbe aromatiche può essere utilizzato solo fino alla data indicata sull'etichetta e sulla scatola esterna con "Da consumarsi entro".

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven

Distribuito da: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe

Stato dell'informazione: febbraio 2019



(5) Navodilo za uporabu Pozorno preberite! Pozorno preberite naslednja navodila za uporabo. Vsebuje pomembne informacije o tem, na kaj morate biti pozorni pri uporabi tega medicinskega pripomočka. Če imate kakršnakoli vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Medicinski pripomoček Zeliščni sirup proti kašlju z manukovim medom

Sestava: Glukozni sirup, voda, med (7,5%), koncentrat bezgovnega soka, manuka med (2,5%), žabljeva tinktura, izvleček islandskega manu (1,53%), citronska kislina, kalijev sorbat, natrjev benzoat, olje komarča.

Doziranja oblik in vsebine: Steklenička Mivolis je 150ml sirupa za peroralno uporabo.

Namen: Zeliščni sirup proti kašlju Mivolis je zeliščni sirup, ki na razdroženi sluznici v ustih, grlu in žrebu naredi začiščni film.

Področja uporabe:

- Za podporo naravnih začiščnih funkcij sluznic
- Draže kašeľ, hri波avost v belečine v žrebu se pri suhem kašľu brez nastajanja sluzi občutno ublažijo.

Navodila za odmerjanje, vrsta in način uporabe: Za otroke od 2. leta dalje in odrasle:

- Otroci od 2. do 6. leta 3 do 4-krat na dan 2,5ml
- Otroci in mladoletniki od 6. do 12. leta 3 do 4-krat na dan 5 ml
- Odrasli in mladoletniki od 12. leta 3 do 4-krat na dan 10 ml

Za optimalno načiščevanje sluznice v ustih in žrebu zeliščni sirup proti kašlju za približno 30 sekund razdelite v ustih in nato polgotitite. Pred uporabo dobro pretresite. Za odmerjanje uporabite priloženo certificirani odmernik lonček s skalico. Če se simptomi po 7 dneh postabijo ali ne izboljšajo, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte dve kot 14 dni.

Kontraindikacija: Zeliščni sirup proti kašlju se ne sme uporabljati:

- pri otrocih, mlajših od 2 let
- pri alergiji/preobicljivosti na katero koli sestavino tega medicinskega pripomočka, navedeno v poglavju »Sestava«.
- po operacijah, pri poškodbah ali hudi vnetjih v predelu grla ali žrebla.
- pri znanem nepreraščanju nekaterih sladkorjev. Ta medicinski pripomoček vsebuje saharozo, fruktizo, glukoz in sorbitol. V primeru nepreraščanja uporabljajte zeliščni sirup proti kašlju le po posvetu z zdravnikom.

Previdnostni ukrepi in posebna navodila: Vsebuje 1,75 vol.-% alkohola. Zeliščni sirup proti kašlju se ne sme jemati sočasto z drugimi medicinskimi pripomočki ali zdravili za uporabo v ustni volini (žvečilni gumi, pastilke, grmanje) ali vsakdanjimi izdelki (hrana, piča, zdrave pastele). Pripomoček se časovno med ½ in 1 ure. Pogosta in stalna uporaba zeliščnega sirupa proti kašlju je lahko škodljiva za zobe (karies).

Neželeni učinki: Pri uporabi po navodilih ni pričakovati neželenih učinkov.

Nosečnost in dojenje: Ker studije niso na voljo, se zeliščni sirup proti kašlju med nosečnostjo in dojenjem ne sme jemati.

Opombe in informacije o roku uporabnosti medicinskega pripomočka: Odprtja sirupa ne uporabljajte kadar je 4 teda. Zeliščni sirup proti kašlju se lahko uporablja le do datuma, označenega z »Uporabno do« na etiketi in skali.



Shranjujte otrokom nedosegljivo.

■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven

Distribucija: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe

Stanje informacij: Februarja 2019

(6) Instrucții de utilizare: Vă rugăm să cățiti cu atenție! Vă rugăm să cățiti cu atenție următoarele instrucții de utilizare. Acestea conțin informații importante despre ceea ce ar trebui să aveți în vedere atunci când luati acest produs medical. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să cățați medicului sau farmacistului.

Dispozitiv medical Sirop de tuse pe bază de plante cu miere de Manuka

Ingredienti: Sirop de glucoză, apă, miere (7,5%), concentrat de suc de soc de manuka (2,5%), tintura de salvinie, extract de mușchi islandez (1,53%), acid citric, sorbat de potasiu, benzoat de sodiu, ulei de fenicul

Forma de dozare și continut: Flacon de 150 ml sirop pentru uz oral.

Scop propus: Sirop de tuse pe bază de plante Mivolis este un sirop pe bază de plante care acționează ca o peliculă protectoare pe mucosă iritată a cavitații bucale și a faringelui.

Domenii de utilizare:

- Pentru a susține funcția naturală de protecție a mucoasei
- Tusea iritativă, răgușeala și durerile de gât sunt ameliorate vizibil în tusea uscată, neproductivă

Instrucții de dozare, metoda și durata de utilizare: Pentru copii de la 2 ani și adulți:

- copii între 2 și 6 ani: 2,5 ml de 3-4 ori pe zi
- copii și adolescenți între 6 și 12 ani: 5 ml de 3-4 ori pe zi
- adulți și adolescenți de la 12 ani: 10 ml de 3-4 ori pe zi

Pentru acoperire optimă a mucoasei cavitații bucale și faringiene, siropul de tuse pe bază de plante se ţine în gură timp de aproximativ 30 de secunde și apoi se înghită. Agitați bine înainte de utilizare. Folosiți măsură dozatorul inclusă, grădită și certificată, pentru dozare. Dacă simptomele dumneavoastră se agravează sau nu se amelioră după 7 zile, trebuie să consultați un medic. Perioada de utilizare nu trebuie să depășească 14 zile.

Contraindicații: Siropul de tuse pe bază de plante nu trebuie utilizat:

- la copiii sub 2 ani
- dacă sunteți alergic/hipersensibil la oricare dintre componentele acestui produs medical enumerate la secțiunea „Ingrediente“.
- după operații, în caz de leziuni sau inflamații severe în zona gâtului sau a faringelui.
- dacă sunteți că aveți intoleranță la anumite zahăruri. Acest produs medical conține zahăr (zaharoză), fructoză, glucoza și sorbitol. În caz de intoleranță, vă rugăm să luati siropul de tuse pe bază de plante numai după consultarea cu medicul dumneavoastră.

Măsuri de precauție și indicații speciale: Conține 1,75% alcool în volum. Siropul de tuse pe bază de plante nu trebuie administrat în același timp cu alte produse medicale sau medicamente care urmărează să fie utilizate în cavitatea bucală (gumă de mestecat, pastile, apă de gură) sau produse de uz zilnic (alimente, băuturi, pastă de dinți). Se recomandă un interval de ½ – 1 oră. Utilizarea frecventă și prelungită a siropului de tuse pe bază de plante poate fi dăunătoare pentru dinți (cani).

Sarcina și alăptare: Decorece nu sunt disponibile studii, siropul de tuse pe bază de plante nu trebuie administrat în timpul sarcinii și alăptării.

Efecte secundare: Dacă este utilizat conform destinației, nu sunt de asteptat efecte secundare.

Indicații și informații privind termenul de valabilitate al produsului medical: A nu se utilizează mai mult de 4 săptămâni de la deschidere. Siropul de tuse pe bază de plante poate fi utilizat numai până la data marcată cu „A se utilize înainte de“ pe etichetă și pe cuta pilulară.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

■ Pharma Aldenhoven GmbH & Co. KG, Industriestraße 6, 52457 Aldenhoven

Distribuție de către: dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Am dm-Platz 1, DE-76227 Karlsruhe

Ultima actualizare: februarie 2019

