

Gebrauchsinformation: Information für den Anwender
Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack 1,2 mg / 0,6 mg Lutschtabletten
Zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 6 Jahren
Wirkstoffe: 2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie.

Dieses Arzneimittel ist auch ohne ärztliche Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** jedoch vorschriftsmäßig angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Beschwerden verschlimmern oder nach 3 Tagen keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** beachten?
3. Wie ist **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** aufzubewahren?
6. Weitere Informationen.

1. WAS IST Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack ist ein Hals- und Rachentherapeutikum.

Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack wird angewendet zur unterstützenden Behandlung bei Entzündungen der Rachenschleimhaut, die mit typischen Symptomen wie Halsschmerzen, Rötung oder Schwellung einhergehen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack BEACHTEN?

Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack DARF NICHT angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen 2,4-Dichlorbenzylalkohol, Amylmetacresol oder einen der sonstigen Bestandteile von **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** sind (siehe Abschnitt 6 „Weitere Informationen“).

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack ist erforderlich:

Grundsätzlich ist bei durch Bakterien verursachten Infektionen die Notwendigkeit einer gezielten antibiotischen Behandlung abzuklären.

Bei Verdacht auf eine Virusinfektion bekämpft **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** nicht die Ursache der Erkrankung.

Bei Verdacht auf eine Pilzinfektion ist die Behandlung mit einem geeigneten Antimykotikum (Medikament für die gezielte Behandlung von Pilzinfektionen) erforderlich.

Kinder und Jugendliche

Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack wird für Kinder unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Bei Einnahme von Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack mit anderen Arzneimitteln:

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen/anwenden bzw. bis vor kurzem eingenommen/angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Es sind keine Wechselwirkungen bekannt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Fragen Sie vor der Einnahme/Anwendung von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Aufgrund fehlender Erfahrung sollten Sie **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** während der Schwangerschaft und Stillzeit nur nach Rücksprache mit Ihrem Arzt anwenden.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack:

Dieses Arzneimittel enthält Maltitol und Isomalt. Bitte nehmen Sie **Dobensana® Zuckerfrei Zitronengeschmack** erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden.

1 Lutschtablette enthält 0,458 g Maltitol und 1,830 g Isomalt entsprechend ca. 0,19 Broteinheiten (BE). Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen.

Der Kalorienwert beträgt 2,3 kcal/g Maltitol/Isomalt. Maltitol/Isomalt kann eine leicht abführende Wirkung haben.

3. WIE IST *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* ANZUWENDEN?

Wenden Sie *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* immer genau nach der Anweisung in dieser Packungsbeilage an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, ist die übliche Dosis: Erwachsene und Kinder ab 6 Jahren:
Alle 2 bis 3 Stunden eine Lutschtablette langsam im Mund zergehen lassen.

Die Tagesdosis sollte 8 Lutschtabletten nicht überschreiten.
Um eine Reizung der Mundschleimhaut zu vermeiden, sollten Sie *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* - wie alle Lutschtabletten - während des Auflösendes im Mund bewegen.

Art und Dauer der Anwendung:
Zur Anwendung im Mund- und Rachenraum.

Dobensana[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* ist für Erkrankungen vorgesehen, die unter den Anwendungsgebieten (siehe Abschnitt 1) genannt sind.

- Sprechen Sie bitte mit einem Arzt,
- wenn Sie unter schweren Halsentzündungen oder Halsschmerzen, die mit hohem Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit oder Erbrechen einhergehen, leiden.
 - wenn Ihre Beschwerden länger als 3 Tage anhalten.

Die Anwendung wird bei Kindern unter 6 Jahren nicht empfohlen.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* zu stark oder zu schwach ist.

Wenn Sie eine größere Menge *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* angewendet haben, als Sie sollten:

Nach versehentlicher Aufnahme einer Vielzahl von *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* benachrichtigen Sie bitte sofort Ihren Arzt.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Bei den Häufigkeitsangaben zu Nebenwirkungen werden folgende Kategorien zugrunde gelegt:

Sehr häufig:	mehr als 1 Behandler von 10
Häufig:	1 bis 10 Behandler von 100
Gelegentlich:	1 bis 10 Behandler von 1.000
Selten:	1 bis 10 Behandler von 10.000
Sehr selten:	weniger als 1 Behandler von 10.000
Nicht bekannt:	Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar

Gelegentlich

Überempfindlichkeitsreaktionen wie Hautausschlag, ein Brennen oder Stechen im Mund oder Hals und Schwellungen der Mund- und Rachenschleimhaut können auftreten.

Überempfindlichkeitsreaktionen klingen nach Absetzen des Medikamentes in der Regel rasch wieder ab. Treten diese schon bei Erstanwendung auf, ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich.

Sehr selten

Magen-Darm-Beschwerden wie Verdauungsstörungen (Dyspepsie), Übelkeit.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigen oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de, anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. WIE IST *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* AUFZUBEWAHREN?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf der Faltschachtel angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Nicht über 25 °C lagern.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* enthält:

Die Wirkstoffe sind: 2,4-Dichlorbenzylalkohol und Amylmetacresol.

1 Lutschtablette enthält 1,2 mg 2,4-Dichlorbenzylalkohol und 0,6 mg Amylmetacresol.

Die sonstigen Bestandteile sind: Zitronenaroma, Saccharin-Natrium, Weinsäure (Ph.Eur.), Maltitol, Isomalt (Ph.Eur.).

Wie *Dobensana*[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* aussieht und Inhalt der Packung:

Dobensana[®] *Zuckerfrei Zitronengeschmack* sind farblose, runde Lutschtabletten und in Packungen zu 24 Lutschtabletten erhältlich.

Pharmazeutischer Unternehmer

Reckitt Benckiser Deutschland GmbH
Darwinstrasse 2-4
69115 Heidelberg
Tel.: (06221) 9982-333

Hersteller

Reckitt Benckiser Healthcare International Limited
Nottingham Site, Thane Road
Nottingham, NG90 2DB
Großbritannien

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt überarbeitet im Januar 2015.