



Sodbrennen akut + protect

✓ lactosefrei
✓ glutenfrei

Doppelherz aktiv Sodbrennen akut + protect
Kautabletten

Zusammensetzung:

Natriumalginat, Natriumbicarbonat, Natriumcarbonat, Calciumcarbonat, Sorbitol, pflanzliches Magnesiumstearat, Hydroxypropylcellulose, Aroma, Siliciumdioxid, Sucralose, Steviolglycoside.

Anwendungsgebiete:

Doppelherz aktiv Sodbrennen akut + protect zur Behandlung von gastroösophagealem Reflux zur Linderung der damit verbundenen Symptome wie Sodbrennen, Sodbrennen in der Schwangerschaft, Refluxösophagitis, saures Aufstoßen, Verdauungsbeschwerden, nächtliche Refluxsymptome, Husten sowie Entzündung von Kehlkopf und Rachen.

Wirkmechanismus:

Doppelherz aktiv Sodbrennen akut + protect basiert auf Natriumalginat und Carbonaten. Seine Wirksamkeit lässt sich durch einen physikalischen Wirkmechanismus erklären. Sobald es mit den sauren pH-Verhältnissen im Magen in Kontakt kommt, bildet Natriumalginat (ein natürliches Polymer, das aus Braunalgen gewonnen wird) ein Gel. Gleichzeitig setzen die Carbonate Kohlendioxid frei, welches ermöglicht, dass das Gel schwimmt und eine Schutzschicht gebildet wird, die als physikalische Barriere den Rückfluss des Magensafts in die Speiseröhre verhindert. Außerdem trägt Bicarbonat dazu bei, den Säuregehalt des Magens zu verringern. Aufgrund seiner besonderen Eigenschaften schützt das Produkt die Schleimhaut der Speiseröhre vor dem Angriff der Säuren mit einem Barriereeffekt. Dies fördert die Regeneration und hilft, das Risiko eines erneuten Auftretens der Refluxösophagitis zu verhindern. Die Formulierung, die sich durch ein spezifisches Gleichgewicht zwischen Natriumalginat und Carbonaten auszeichnet, fördert die schnelle Wirkung.

Anwendungshinweise:

Erwachsene und Kinder über 12 Jahre: 2 oder 4 Tabletten nach den Mahlzeiten und vor dem Schlafengehen.

Die Tabletten müssen gründlich zerkaut werden. Nach der Einnahme kann mit Wasser nachgespült werden.

⚠ Warnhinweise:

Sie dürfen dieses Produkt nach dem auf dem Umkarton angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

- Nicht bei schwerer Niereninsuffizienz einnehmen.
- Bei Überempfindlichkeit gegen die Bestandteile des Medizinprodukts dürfen Sie es nicht einnehmen.
- Falls Nebenwirkungen auftreten, müssen Sie die Behandlung beenden und sich an Ihren Arzt wenden.
- Das Produkt kann die Aufnahme von oralen Arzneimitteln beeinträchtigen. Bitte fragen Sie Ihren Arzt um Rat, wenn Sie andere orale Arzneimittel einnehmen. In jedem Fall sollte ein Zeitabstand von 2 Stunden zwischen der Einnahme des Produkts und der Einnahme eines Arzneimittels eingehalten werden.
- Sollten sich die Beschwerden nach 7 Behandlungstagen nicht bessern, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.
- Das Produkt kann Blähungen verursachen. Der vorschriftsmäßige Gebrauch des Produkts verringert die Wahrscheinlichkeit ihres Auftretens.
- Dieses Produkt enthält bei Einnahme einer Einzeldosis (entsprechend 2 Tabletten à 1 Gramm) etwa 100 mg (4,4 mmol) Natrium und etwa 36 mg (0,9 mmol) Calcium.

Bitte wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie sich salzarm ernähren müssen, z. B. wenn sie an Bluthochdruck, einer eingeschränkten Herz-, Nieren- oder Leberfunktion oder an einer Hypercalcämie, Nephrocalcinose oder wiederkehrenden calciumhaltigen Nierensteinen leiden.

Lagerung:

Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite und Sichtweite von Kindern auf.

Lagern Sie das Produkt bei einer Temperatur zwischen 8 °C und 25 °C an einem trockenen Ort, fern von Licht- und Wärmequellen.

Hersteller:

Biofarma - Via Castelliere 2
Mereto di Tomba (UD), Italien

Vertrieb:


Queisser
PHARMA

GmbH & Co. KG
Schleswiger Str. 74
24941 Flensburg

Mat.-Nr.: 90586436

MEDIZINPRODUKT **CE0373**

Das Produkt ist in Packungen mit 20 1-g-Kautabletten erhältlich.
Datum der letzten Überarbeitung: 07/04/2021
(IFU_04/21r0_04/21)