



## **Pflanzliches Arzneimittel**

# **Spitzwegerich Hustensirup 0,2 g/g**

**Sirup zur Anwendung bei Erwachsenen und Kindern ab 1 Jahr**

Spitzwegerichkraut-Fluidextrakt

**Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.**

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers ein.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nach einer Woche nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

### **Was in dieser Packungsbeilage steht**

1. Was ist Spitzwegerich Hustensirup und wofür wird er angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup beachten?
3. Wie ist Spitzwegerich Hustensirup einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Spitzwegerich Hustensirup aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

### **1. WAS IST SPITZWEGERICH HUSTENSIRUP UND WOFÜR WIRD ER ANGEWENDET?**

Spitzwegerich Hustensirup ist ein pflanzliches Arzneimittel, das zur Besserung der Beschwerden bei Erkältungskrankheiten der Atemwege und entzündlichen Veränderungen der Mund- und Rachenschleimhaut angewendet wird.

### **2. WAS SOLLTEN SIE VOR DER EINNAHME VON SPITZWEGERICH HUSTENSIRUP BEACHTEN?**

**Spitzwegerich Hustensirup darf nicht eingenommen werden,**

- wenn Sie allergisch gegen Spitzwegerichkraut oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind.

### **Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen**

Wenn bei Ihnen Fieber, Atemnot, eitriger oder blutiger Auswurf auftreten oder Ihre Beschwerden länger andauern, sollten Sie Ihren Arzt aufsuchen.

### **Kinder**

Zur Anwendung dieses Arzneimittels bei Säuglingen (unter 1 Jahr) liegen keine ausreichenden Untersuchungen vor. Die Anwendung von Spitzwegerich Hustensirup bei Säuglingen wird nicht empfohlen.

Bei Säuglingen und Kleinkindern sollten Sie zur Behandlung eines Hustens generell einen Arzt aufsuchen.

### **Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup zusammen mit anderen Arzneimitteln**

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Es wurden keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt. Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt.

### **Schwangerschaft und Stillzeit**

Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Einnahme dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Die Einnahme von Spitzwegerich Hustensirup während der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen.

### **Verkehrstüchtigkeit und die Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen**

Es sind keine besonderen Vorsichtsmaßnahmen erforderlich.

### **Spitzwegerich Hustensirup enthält Ethanol (Alkohol), Glucose und Fructose**

**Warnhinweis:** Dieses Arzneimittel enthält 7 Vol.-% Alkohol. Bei Beachtung der Dosierungsanleitung werden Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren bei jeder Einnahme (10 ml Sirup) bis zu 0,6 g Alkohol zugeführt, Kindern von 1 bis 11 Jahren bei jeder Einnahme (5 ml Sirup) bis zu 0,3 g Alkohol. Ein gesundheitliches Risiko besteht u. a. bei Leberkranken, Alkoholkranken, Epileptikern, Patienten mit organischen Erkrankungen des Gehirns, Schwangeren und Stillenden. Die Wirkung anderer Arzneimittel kann beeinträchtigt oder verstärkt werden.

Bitte nehmen Sie Spitzwegerich Hustensirup erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden oder wenn bei Ihnen eine hereditäre Fructoseintoleranz (HF) – eine seltene angeborene Erkrankung, bei der Fructose nicht abgebaut werden kann – festgestellt wurde. Eine Einzeldosis von 5 ml enthält 3,89 g Glucose und eine Einzeldosis von 10 ml enthält 7,79 g Glucose. Wenn Sie eine Diabetes-Diät einhalten müssen, sollten Sie dies berücksichtigen. Dieses Arzneimittel enthält 650 mg Fructose pro Einzeldosis von 5 ml und 1.300 mg Fructose pro Einzeldosis von 10 ml, entsprechend 130 mg/ml.

